

‘Gebiedendocument’

Overzicht van habitattypen en soorten waarvoor gebieden zijn aangemeld en begrenzing van gebieden

Inhoud:

1. Inleiding
2. Begrenzingsmethodiek
 - 2.1. Aanpak
 - 2.2. Algemene uitgangspunten
 - 2.3. Drie typen gebieden
3. Waarvoor zijn de gebieden aangemeld
 - 3.1. Leeswijzer
 - 3.2. Overzicht van habitattypen en soorten waarvoor de gebieden zijn aangemeld

1. Inleiding

Dit document (het 'Gebiedendocument') bevat nadere informatie over de Nederlandse bijdrage aan de communautaire lijst van gebieden die in aanmerking komen voor aanwijzing onder de Habitatrichtlijn.

Hoofdstuk 2 gaat over de begrenzingsmethodiek van de Habitatrichtlijngebieden. De wijze van begrenzing is beschreven in hoofdstuk 2.1 Bij de begrenzing van Habitatrichtlijngebieden in Nederland is een aantal algemene uitgangspunten gehanteerd. Deze worden aangeduid in hoofdstuk 2.2. Hoofdstuk 2.3 geeft een toelichting op drie algemene typen van begrenzing.

Het 'Verantwoordingsdocument' geeft een uitvoerige toelichting op de gehanteerde criteria voor de selectie van de Habitatrichtlijngebieden. In het 'Lijstdocument' is per habitattypen en per soort aangegeven welke gebieden Nederland als belangrijkste heeft geselecteerd voor het desbetreffende habitattypen dan wel de desbetreffende soort.

In dit document (het 'Gebiedendocument') wordt per gebied een overzicht gegeven van alle habitattypen en/of soorten waarvoor een gebied is aangemeld bij de Europese Commissie in Brussel. Deze gegevens zijn de Commissie verstrekt middels een speciaal ontwikkelde database die is gebaseerd op het Standaardformulier Natura 2000 dat in 1997 door de Commissie voor dit doel is vastgesteld¹. De inhoud van de database zoals deze is toegezonden aan de Europese Commissie, is te vinden op de website van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (www.minlnv.nl/natura2000). Dit geeft meer diepgaande informatie bijvoorbeeld over de mate van representativiteit van de habitattypen die in een bepaald gebied voorkomen.

Bedoeld overzicht is opgenomen in hoofdstuk 3 van dit document. De gebieden zijn per provincie op alfabetische volgorde gerangschikt. Tevens zijn opgenomen de 'sitecodes' van de gebieden in database Natura 2000.

¹ De Lidstaten zijn verplicht om de gebieden die worden voorgesteld voor aanwijzing onder de Habitatrichtlijn, bij de Europese Commissie aan te melden middels een speciaal voor dat doel ontwikkeld formulier. Dit "informatieformulier voor als Natura 2000-gebied voorgestelde gebieden" is in 1997 in het Publikatieblad van de EG bekend gemaakt (L 107, 27.4.97). Deze gegevens moeten de Commissie in staat stellen om de totstandkoming van het ecologische netwerk Natura 2000 te coördineren. Op grond van het formulier is een database ontwikkeld die moet worden bijgewerkt en aangevuld bij nieuwe aanmeldingen en in de toekomst ook bij wijzigingen die zich in de gebieden voordoen.

2. Begrenzingsmethodiek

2.1 Aanpak

Bij het begrenzen van de Habitatrictlijnggebieden is een aantal algemene uitgangspunten gehanteerd. Deze worden beschreven in hoofdstuk 2.2. De toepassing van de algemene uitgangspunten heeft geresulteerd in drie typen van gebiedsbegrenzing waarop in hoofdstuk 2.3. een toelichting op wordt gegeven.

2.2. Algemene uitgangspunten

Bij het begrenzen van de Habitatrictlijngebieden is een aantal algemene uitgangspunten gehanteerd. Deze algemene uitgangspunten zijn gebaseerd op artikel 1, 3 en 4 (bijlage III) van de Habitatrictlijn.

Habitattypen en soorten van de bijlagen: de habitattypen van bijlage I en de leefgebieden van de soorten van bijlage II van de Habitatrictlijn (en dus niet de soorten van bijlage IV) vormen het uitgangspunt voor de begrenzing. Dit is inclusief in kwaliteit achteruitgegangene en gedegenerende terreindelen (zoals bijvoorbeeld vergraste of met opslag dichtgegroeide heide), indien herstel haalbaar is en voor zover nodig voor de instandhouding van de aanwezige habitattypen en/of soorten.

Herkenbare eenheden en identiteit: streven naar de begrenzing van herkenbare en beheerbare eenheden: ecologische eenheden (bijvoorbeeld op basis van vegetatiestructuur, hydrologie of geomorfologie) of beheerseenheden. Door eenheden op deze manier te begrenzen krijgt het gebied een duidelijke identiteit.

‘Cement tussen de bakstenen’: de begrenzing van ecologische eenheden impliceert dat het Habitatrictlijngebied bestaat uit: de habitattypen van bijlage I en het leefgebied van de soorten van bijlage II én een stelsel van natuurwaarden waarvoor het gebied niet is geselecteerd en/of niet is aangemeld: het ‘cement tussen de bakstenen’, maar die wel integraal onderdeel uitmaken van de ecosystemen waarvan de betreffende habitattypen en soorten deel uitmaken. Dit cement is nodig voor herstel en/of instandhouding van de betreffende habitattypen en/of soorten.

Deelgebieden: bij zeer sterke versnippering in meerdere deelgebieden worden alleen deze deelgebieden begrensd. De verschillende deelgebieden bevatten dan elk afzonderlijk de habitattypen en/of soorten waarvoor het gebied geselecteerd is.

Enclaves: binnen grote eenheden zijn enclaves van grootschalige landbouw en/of bebouwing uitgesloten, voor zover ze geen wezenlijke bijdrage leveren aan de instandhouding van de betreffende habitattypen en/of de soorten.

Aansluiting bij administratieve grenzen: er is zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande administratieve grenzen (bijvoorbeeld begrenzing onder de Natuurbeschermingswet aangewezen gebieden, Nationaal Park, Vogelrichtlijngebied, en/of eigendomsgrenzen).

Herkenbare topografische lijnen: bij voorkeur vallen de gebiedsgrenzen samen met duidelijk in het landschap herkenbare topografische lijnen, zoals wegen, sloten, heggen, oevers, bosranden en markante verschillen in landgebruik.

2.3. Drie typen gebieden

De concrete begrenzing van de gebieden is gebaseerd op maatwerk. De toepassing van de algemene uitgangspunten heeft op hoofdlijnen geresulteerd in drie typen van gebiedsbegrenzing. Afhankelijk van (1) de oppervlakte en (2) de mate van versnippering van de gebieden kunnen drie begrenzingstypen worden onderscheiden:

- Type I. Grote aaneengesloten gebieden;
- Type II. Kleine gebieden;
- Type III. Twee of meer deelgebieden.

Type I. Grote aaneengesloten gebieden

Kenmerken van dit type gebieden zijn:

- Doorgaans een uitgestrekte oppervlakte;
- Bestaande uit een mozaïek van habitattypen/leefgebied van soorten en “cement” in de vorm van overig natuurgebied;
- Vaak veel verschillende habitattypen en/of soorten.

Voorbeelden:

- *Duingebieden* (Meijendel en Berkheide; Duinen Texel, Waal en burg, Dijkmanshuizen en de Bol);
- *Grote bos- en heideterreinen* (Veluwe, Dwingelderveld, Sallandse Heuvelrug);
- *Grote wateren: open zee, zeearmen en meren* (Voordelta, Grevelingen, Veluwemeer en Wolderwijd, Zwarte Meer, Westerschelde);
- *Grote aaneengesloten laagveengebieden* (Weerribben, Wieden, IJperveld/Oostzanerveld/Varkensland);
- *Hoogveengebieden* (Witterveld, Bargerveen).

Type II. Kleine gebieden

Kenmerken voor dit type:

- Doorgaans een klein oppervlakte;
- Voor het grootste deel bestaande uit aaneengesloten gebied of gebieden die dat vroeger waren;
- Vaak één of enkele habitattypen en of leefgebied van een soort.

Voorbeelden:

- *Blauwgraslanden* (Bennekomse Meent, Groot Zandbrink, Stelkampseveld (Beekvliet));
- *Riviergraslanden* (Amerongse Bovenpolder, Oeffeltermeent);
- *Kleine bosgebieden* (Bunder- en Elsloërbos, Norgerholt, Liefstinghsbroek);

- *Kalkgraslanden* (Bemelerberg en Schiepersberg, Kunderberg);
- *Kreken Zeeuws-Vlaanderen* (Groote Gat, Canisvlietse Kreek);
- *Vennen* (Teeselinkven, Lonnekermeer, Boddenbroek);

Type III. Twee of meer deelgebieden

Kenmerken van dit type:

- Een grote, maar niet aaneengesloten oppervlakte;
- Naast een aaneengesloten kerngebied kleinere, maar wel belangrijke deelgebieden omvattend;
- Open water (beek, rivier, meer, plas) omvattend van belang voor de instandhouding van het betreffende habitatype en/of de soort waarvoor het gebied wordt aangemeld;
- Bestaat uit een mozaïek van habitattypen en/of leefgebieden van soorten en tussenliggende gebieden in de vorm van bijvoorbeeld landbouwgebied en bebouwing;
- Veel verschillende habitattypen en/of soorten.

Voorbeelden:

- *Beekdalen* (Geuldal, Dinkelland, Geleenbeekdal);
- *Uiterwaarden, inclusief rivierlopen* (Gelderse Poort, IJsseluiterwaarden, Oude Maas);
- *Laagveengebieden* (Langstraat bij Sprang-Capelle, Polder Westzaan).

3. Waarvoor zijn gebieden aangemeld

3.1. Leeswijzer

In hoofdstuk 3.2. worden per gebied de habitattypen en/of soorten genoemd waarvoor het desbetreffende gebied is aangemeld. Het volgende onderscheid is daarbij van belang:

In de eerste plaats gaat het om de habitattypen en/of soorten waarvoor een gebied wordt gerekend tot de belangrijkste gebieden. Hoofdstuk 3.2. vermeldt deze habitattypen en soorten onder het kopje 'belangrijkste gebied voor.

In de tweede plaats gaat het om de habitattypen en/of soorten waarvoor het betreffende gebied tevens is aangemeld. Hoofdstuk 3.2. noemt deze habitattypen en soorten onder het kopje 'verder aangemeld voor'.

3.2 Overzicht van habitattypen en soorten waarvoor de gebieden zijn aangemeld

Dit hoofdstuk geeft per gebied een overzicht van de habitattypen en/of soorten waarvoor het desbetreffende gebied is aangemeld.

De inhoud van de database (zie website: www.minlnv.nl/natura2000) geeft nadere informatie over de gebieden en over de mate van voorkomen van de betreffende habitattypen en soorten.

De habitattypen en soorten zullen worden beschreven in twee publicaties die in voorbereiding zijn: Europese Natuur in Nederland: Habitattypen van bijlage I en Europese Natuur in Nederland: Soorten van bijlage II. In de eerste publicatie worden de habitattypen (voor zover bestaande uit vegetaties) beschreven aan de hand van de plantensociologische eenheden (c.q. plantengemeenschappen en verbonden) waardoor de habitattypen in ons land zijn vertegenwoordigd. De tweede publicatie gaat vooral in op de levenswijze en de aard van de leefgebieden van de betreffende soorten.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de gebieden wordt verwezen naar de (in voorbereiding zijnde) publicatie: Werkdocument beschrijving gebieden.

Beide typen gebieden – de al aangemelde gebieden en de nieuwe aangemelde gebieden – zijn in dit hoofdstuk per provincie en in alfabetisch volgorde gerangschikt.

Waar gebieden gelegen zijn op de grens van twee of drie provincies, zijn deze gebieden in dit hoofdstuk maar één keer genoemd.

| |
|-------------------|
| Provincie Drenthe |
|-------------------|

- NL2000002:** Bargerveen gebied 3
- NL9801009:** Drentsche Aa gebied 12
- NL9803011:** Drents-Friese Wold en Leggelderveld gebied 13
- NL2003014:** Drouwenerzand gebied 92
- NL3000070:** Dwingelderveld gebied 23
- NL2003015:** Elperstroom gebied 93
- NL9801007:** Fochteloërveen en Esmeer gebied 25
- NL9801071:** Havelte-oost gebied 34
- NL2003031:** Mantingerbos gebied 109
- NL2003032:** Mantingerzand gebied 110
- NL2003034:** Norgerholt gebied 112
- NL1000003:** Witterveld gebied 76

Voor de kaarten per gebied wordt verwezen naar het 'Kaartenoverzicht'

NL2000002: Bargerveen *gebied 3*
2089 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 7110 *Actief hoogveen

Verder aangemeld voor:

Habitattype 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)
4030 Droge Europese heide
6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)
7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is

NL9801009: Drentsche Aa *gebied 12*
3966 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 6230 | *Soortenrijke heischrale gebieden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) |
| Soort | 1099 | Rivierprik |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 2310 | Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Stekelbrem (Genista) |
| | 2320 | Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Kraaihei (Empetrum nigrum) |
| | 2330 | Open grasland met Buntgras en Struisgrassoorten (Corynephorus en Agrostis-soorten) op landduinen |
| | 3130 | Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (Littorelletalia uniflorae) en/of de Dwergbiezen-klasse (Isoëto-Nanojuncetea) |
| | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix) |
| | 6410 | Grasland met Pijpestrootje (Molinia) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion) |
| | 9160 | Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen behorend tot het Haagbeukenverbond (Carpinion betuli) |
| | 9190 | Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Zomereik (Quercus robur) |
| | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| | 5130 | Jeneverbes (Juniperus communis)-formaties in heide of kalkgrasland |
| Soort | 1134 | Bittervoorn |
| | 1145 | Grote modderkruiper |
| | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1166 | Kamsalamander |

NL9803011: Drents-Friese Wold en Leggelderveld *gebied 13*
7099 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 2320 | Psammofiele heide met Struikhei (<i>Calluna</i>) en Kraaihei (<i>Empetrum nigrum</i>) |
| | 2330 | Open grasland met Buntgras en Struisgrassoorten (<i>Corynephorus</i> en <i>Agrostis</i> -soorten) op landduinen |
| | 3110 | Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met oeverkruidvegetatie (<i>Littorelletalia uniflorae</i>) |
| | 7150 | Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Snelbies-verbond (<i>Rhynchosporion</i>) |
| Soort | 1166 | Kamsalamander |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 2310 | Psammofiele heide met Struikhei (<i>Calluna</i>) en Stekelbrem (<i>Genista</i>) |
| | 3130 | Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (<i>Littorelletalia uniflorae</i>) en/of de Dwergbiezen-klasse (<i>Isoëto-Nanojuncetea</i>) |
| | 4010 | Noord-Atlantisch vochtige heide met Dophei (<i>Erica tetralix</i>) |
| | 5130 | Jeneverbes (<i>Juniperus communis</i>)-formaties in heide of kalkgrasland |
| | 6230 | *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) |
| | 9190 | Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Zomereik (<i>Quercus robur</i>) |
| Soort | 1831 | Drijvende waterweegbree |

NL2003014: Drouwenerzand *gebied 92*
223 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 5130 Jeneverbes (*Juniperus communis*)-formaties in heide of kalkgrasland

Verder aangemeld voor:

Habitatype 2310 Psammofiele heide met Struikhei (*Calluna*) en Stekelbrem (*Genista*)
2320 Psammofiele heide met Struikhei (*Calluna*) en Kraaihei (*Empetrum nigrum*)
2330 Open grasland met Buntgras en Struisgrassoorten (*Corynephorus* en *Agrostis*-soorten) op landduinen
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)
9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Zomereik (*Quercus robur*)

NL3000070: Dwingelderveld *gebied23*
3766 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 2320 | Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Kraaihei (Empetrum nigrum) |
| | 3160 | Dystrofe natuurlijke meren en poelen |
| | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix) |
| | 5130 | Jeneverbes (Juniperus communis)-formaties in heide of kalkgrasland |
| | 7150 | Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Snavelbies-verbond (Rhynchosporion) |
| | 9190 | Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Zomereik (Quercus robur) |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 2310 | Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Stekelbrem (Genista) |
| | 3130 | Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (Littorelletalia uniflorae) en/of de Dwergbiezen-klasse (Isoëto-Nanojuncetea) |

Soort

| | |
|------|---------------|
| 1166 | Kamsalamander |
| 1318 | Meervleermuis |

NL2003015: Elperstroom *gebied 93*
130 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 7230 Alkalisch laagveen

Verder aangemeld voor:

Habitatype 6230 *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)

NL9801007: Fochteloërveen en Esmeer *gebied 25*
2601 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is

Verder aangemeld voor:

Habitattype 3160 Dystrofe natuurlijke meren en poelen
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)
4030 Droge Europese heide

NL9801071: Havelte-oost *gebied 34*
1755 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 6230 *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)

Verder aangemeld voor:

Habitatype 2310 Psammofiele heide Struikhei (Calluna) en Stekelbrem (Genista)
2320 Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Kraaihei (Empetrum nigrum)
2330 Open grasland met Buntgras en Struisgrassoorten (Corynephorus en Agrostis-soorten) op landduinen
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix)
7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Snelbies-verbond (Rhynchosporion)
9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Zomereik (Quercus robur)

Soort 1166 Kamsalamander

NL2003031: Mantingerbos *gebied 109*
47 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 9120 Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Hulst (Ilex) - of soms Taxus (Quercion robori-petraea of Ilici fagion)

Geen verder aanmelding

NL2003032: Mantingerzand *gebied 110*
810 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitattype 2320 Psammofiele heide met Struikhei (*Calluna*) en Kraaihei (*Empetrum nigrum*)
5130 Jeneverbes (*Juniperus communis*)-formaties in heide of kalkgrasland

Verder aangemeld voor:

- Habitattype 2310 Psammofiele heide met Struikhei (*Calluna*) en Stekelbrem (*Genista*)
2330 Open grasland met Buntgras en Struisgrassoorten (*Corynephorus* en *Agrostis*-soorten) op landduinen
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)

NL2003034: Norgerholt *gebied 112*
27 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 9120 Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Hulst (Ilex) – of soms Taxus (Quercion robori-petraea of Ilici fagion)

Geen verdere aanmelding

NL1000003: Witterveld *gebied 76*
467 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 3160 Dystrofe natuurlijke meren en poelen
7110 *Actief hoogveen
91D0 *Veenbossen: Berkenbos met veenmos

Verder aangemeld voor:

Habitattype 2310 Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Stekelbrem (Genista)
2320 Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Kraaihei (Empetrum nigrum)
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix)
7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is
7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Snelbies-verbond (Rhynchosporion)

Provincie Flevoland

NL2003048: Veluwemeer en Wolderwijd gebied 126

NL2003056: Zwarte Meer gebied 134

*Voor de kaarten per gebied wordt verwezen naar het
'Kaartenoverzicht'*

NL2003048: Veluwemeer en Wolderwijd *gebied 126*
1820 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische vegetaties met Kranswieren (*Chara* spp.)

Verder aangemeld voor:

Habitattype 3150 Van nature eutrofe meren met vegetaties van het Verbond van grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond (Magnopotamion of Hydrocharition)

Soort 1134 Bittervoorn
1149 Kleine modderkruiper
1163 Rivierdonderpad
1318 Meervleermuis

NL2003056: Zwarte Meer *gebied 134*
2191 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond (Magnopotamion of Hydrocharition)

Verder aangemeld voor:

Habitattype 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones
6510 Laaggelegen schraal hooiland met Grote vossenstaart en/of Grote pimpernel (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

Soort 1099 Rivierprik
1134 Bittervoorn
1149 Kleine modderkruiper
1163 Rivierdonderpad
1318 Meervleermuis

| |
|---------------------|
| Provincie Friesland |
|---------------------|

- NL3000044:** Alde Feanen gebied 1
- NL9801004:** Bakkeveense Duinen gebied 2
- NL9803011:** Drents-Friese Wold en Leggelderveld² gebied 13
- NL2003057:** Duinen Ameland gebied 14
- NL2003058:** Duinen Schiermonnikoog gebied 16
- NL2003059:** Duinen Terschelling gebied 18
- NL2003061:** Duinen Vlieland gebied 20
- NL9801007:** Fochteloërveen en Esmeer³ gebied 25
- NL1000002:** Friese IJsselmeerkust gebied 26
- NL2003020:** Grootte Wielen gebied 98
- NL2003062:** Noordzeekustzone gebied 51
- NL2003038:**
Oudegaasterbrekken, Gouden Bodem en Fluessen gebied 115
- NL9803006:** Rottige Meenthe en Brandemeer gebied 57
- NL1000001:** Waddenzee gebied 69
- NL2003050:**
Wijnjeterper Schar en Terwispeler Grootschar gebied 128

Voor de kaarten per gebied wordt verwezen naar het 'Kaartenoverzicht'

² Zie provincie Drenthe

³ Idem

NL3000044: Alde Feanen *gebied 1*
2095 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitatype 7210 *Kalkhoudende moerassen met Galigaan (*Cladium mariscus*) en soorten van het Knopbies-verbond (*Caricion davallianae*)
91D0 *Veenbossen: Berkenbos met veenmos

Verder aangemeld voor:

- Habitatype 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond (*Magnopotamion* of *Hydrocharition*)
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)
6410 Grasland met Pijpestrootje (*Molinia*) op kalkhoudende of lemige kleibodem (*Blauwgrasland*, EU-Molinion)
7140 Overgangs- en trilvenen
- Soort 1134 Bittervoorn
1145 Grote modderkruiper
1149 Kleine modderkruiper
1163 Rivierdonderpad
1318 Meervleermuis
1340 *Noordse woelmuis

NL9801004: Bakkeveense Duinen *gebied 2*
263 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 2320 Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Kraaihei (Empetrum nigrum)

Verder aangemeld voor:

Habitattype 2310 Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Stekelbrem (Genista)
2330 Open grasland met Buntgras en Struisgrassoorten (Corynephorus en Agrostis-soorten) op landduinen

NL2003057: Duinen Ameland *gebied 14*
2016 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 2120 | Wandelende duinen op de strandwal met Helm (<i>Ammophila arenaria</i> ; z.g. witte duinen) |
| | 2140 | *Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei (<i>Empetrum nigrum</i>) |
| | 2170 | Duinen met Kruiwilg (<i>Salix repens</i> spp. <i>argentea</i>) |
| | 2190 | Vochtige duinvalleien |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 2110 | Embryonale wandelende duinen |
| | 2130 | Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) |
| | 2160 | Duinen met Duindoorn (<i>Hippophaë rhamnoides</i>) |
| Soort | 1903 | Groenknolorchis |

NL2003058: Duinen Schiermonnikoog gebied 16
1021 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 2110 | Embryonale wandelende duinen |
| | 2120 | Wandelende duinen op de strandwal met Helm (<i>Ammophila arenaria</i> ; z.g. witte duinen) |
| | 2130 | *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) |
| | 2170 | Duinen met Kruiwilg (<i>Salix repens</i> ssp. <i>argentea</i>) |
| | 2190 | Vochtige duinvalleien |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 1310 | Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (<i>Salicornia</i> sp.) en andere zoutminnende planten |
| | 2140 | *Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei (<i>Empetrum nigrum</i>) |
| | 2160 | Duinen met Duindoorn (<i>Hippophaë rhamnoides</i>) |
| Soort | 1903 | Groenknolorchis |

NL2003059: Duinen Terschelling *gebied 18*
5101 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 2110 | Embryonale wandelende duinen |
| | 2120 | Wandelende duinen op de strandwal met Helm (<i>Ammophila arenaria</i> ; z.g. witte duinen) |
| | 2130 | *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) |
| | 2140 | *Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei (<i>Empetrum nigrum</i>) |
| | 2170 | Duinen met Kruipwilg (<i>Salix repens</i> ssp. <i>argentea</i>) |
| | 2190 | Vochtige duinvalleien |
| Soort | 1903 | Groenknolorchis |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 1310 | Eenjarig pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (<i>Salicornia</i> sp.) en andere zoutminnende planten |
| | 1330 | Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (<i>Glaucopuccinellietalia maritimae</i>) |
| | 2160 | Duinen met Duindoorn (<i>Hippophaë rhamnoides</i>) |
| | 2180 | Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied |
| Soort | 1014 | Nauwe korfslak |
| | 1831 | Drijvende waterweegbree |

NL2003061: Duinen Vlieland *gebied 20*
1532 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 2140 | Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei (<i>Empetrum nigrum</i>) |
| | 2190 | Vochtige duinvalleien |
| Soort | 1903 | Groenknolorchis |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 1310 | Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (<i>Salicornia</i> sp.) en andere zoutminnende soorten |
| | 1330 | Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (<i>Glaucopuccinellietalia maritimae</i>) |
| | 2120 | Wandelende duinen op de strandwal met Helm (<i>Ammophila arenaria</i> ; z.g. witte duinen) |
| | 2130 | *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) |
| | 2160 | Duinen met Duindoorn (<i>Hippophaë rhamnoides</i>) |
| | 2170 | Duinen met Kruipwilg (<i>Salix repens</i> ssp. <i>argentea</i>) |

NL1000002: Friese IJsselmeerkust *gebied 26*
2526 ha

Belangrijkste gebied voor:

Soort 1340 *Noordse woelmuis

Verder aangemeld voor:

Habitatype 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en
van de montane en alpiene zones
7140 Overgangs- en trilvenen

Soort 1134 Bittervoorn
1163 Rivierdonderpad
1318 Meervleermuis
1903 Groenknolorchis

NL2003020: Groote Wielen *gebied 98*
608 ha

Belangrijkste gebied voor:

Soort 1340 *Noordse woelmuis

Verder aangemeld voor:

Habitatype 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (*Littorelletalia uniflorae*) en/of Dwergbiezen-klasse (*Isoeto-Nanojuncetea*)
6410 Grasland met Pijpestrootje (*Molinia*) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-molinion)

Soort 1134 Bittervoorn
1149 Kleine modderkruiper
1318 Meervleermuis

NL2003062: Noordzeekustzone *gebied 51*
24838 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 1110 | Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken |
| Soort | 1351 | Bruinvis |
| | 1364 | Grijze zeehond |
| | 1365 | Zeehond |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------|------|------------|
| Soort | 1095 | Zeeprik |
| | 1099 | Rivierprik |
| | 1103 | Fint |

NL2003038:

Oudegaasterbrekken, Gouden Bodem en Fluessen *gebied 115*
3076 ha

Belangrijkste gebied voor:

Soort 1340 *Noordse woelmuis

Verder aangemeld voor:

Habitatype 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond (Magnopotamion of Hydrocharition)
6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones

Soort 1134 Bittervoorn
1318 Meervleermuis

NL9803006: Rottige Meenthe en Brandemeer *gebied 57*
1395 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 7210 | *Kalkhoudende moerassen met Galigaan (<i>Cladium mariscus</i>) en soorten van het Knopbies-verbond (<i>Caricion davallianae</i>) |
| Soort | 1060 | Grote vuurvliinder |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (<i>Erica tetralix</i>) |
| | 3150 | Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond (<i>Magnopotamion</i> of <i>Hydrocharition</i>) |
| | 7140 | Overgangs- en trilvenen |
| | 91D0 | *Veenbossen: Berkenbos met veenmos |
| Soort | 1042 | Gevlekte witsnuitlibel |
| | 1134 | Bittervoorn |
| | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1318 | Meervleermuis |

NL1000001: Waddenzee gebied 69
259214 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 1110 | Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken |
| | 1130 | Estuaria |
| | 1140 | Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten |
| | 1310 | Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (<i>Salicornia</i> sp.) en andere zoutminnende soorten |
| | 1330 | Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (<i>Glaucopuccinellietalia maritimae</i>) |
| | 2110 | Embryonale wandelende duinen |
| | 2120 | Wandelende duinen op de strandwal met Helm (<i>Ammophila arenaria</i> ; z.g. witte duinen) |
| Soort | 1103 | Fint |
| | 1364 | Grijze zeehond |
| | 1365 | Zeehond |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 1320 | Schorren met slijkgrasvegetatie (<i>Spartinion maritimae</i>) |
| | 2130 | *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) |
| Soort | 1095 | Zeeprik |
| | 1099 | Rivierprik |

NL2003050: Wijnjeterperschar en Terwispeler Grootschar *gebied 128*
569 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitattype 6410 Grasland met Pijpestrootje (*Molinia*) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion)
6230 *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)

Verder aangemeld voor:

- Habitattype 4010 Noord-Atlantisch vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)
4030 Droge Europese heide
- Soort 1145 Grote modderkruiper
1149 Kleine modderkruiper

| |
|----------------------|
| Provincie Gelderland |
|----------------------|

- NL2003005:** Bekendelle gebied 83
NL2003006: Bennekomse Meent gebied 84
NL3004001:
Boezem van Brakel, Pompveld en Kornsche Boezem gebied 135
NL2003011: Bruuk gebied 89
NL9801024: Gelderse Poort gebied 27
NL2003022: IJsseluiterwaarden⁴ gebied 100
NL9801072: Korenburgerveen gebied 39
NL3004005:
Leusveld, Voorstonden en Empesche-/Tondensche Heide gebied 141
NL2003041: Rijswaard en Kil van Hurwenen gebied 119
NL2003044: Stelkampsveld (Beekvliet) gebied 122
NL2003046: Teeselinkven gebied 124
NL9801023: Veluwe gebied 65
NL2003048: Veluwemeer en Wolderwijd⁵ gebied 126
NL2003051: Willinks Weust gebied 129
NL2003053: Wooldse Veen gebied 131
NL3004007: Zuider Lingedijk en Diefdijk zuid gebied 137

Voor de kaarten per gebied wordt verwezen naar het 'Kaartenoverzicht'

⁴ Zie Overijssel

⁵ Zie Flevoland

NL2003005: Bekendelle *gebied 83*
93 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitattype 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen behorend tot het Haagbeukenverbond (*Carpinion betuli*)
91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (*Alnus glutinosa*) en Es (*Fraxinus excelsior*) (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

Verder aangemeld voor:

- Soort 1096 Beekprik
1149 Kleine modderkruiper

NL2003006: Bennekomse Meent *gebied 84*
49 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 6410 Grasland met Pijpestrootje (Molinia) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion)

Verder aangemeld voor:

Soort 1149 Kleine modderkruiper

NL3004001:

Boezem van Brakel, Pompveld en Kornsche Boezem *gebied 135*
720 ha

Belangrijkste gebied voor:

Soort 1145 Grote modderkruiper

Verder aangemeld voor:

Habitatype 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond (Magnopotamion of Hydrocharition)
6120 *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
6510 Laaggelegen schraal hooiland met Grote vossenstaart en/of Grote pimpernel (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Soort 1134 Bittervoorn
1149 Kleine modderkruiper
1163 Rivierdonderpad
1166 Kamsalamander

NL2003011: Bruuk *gebied 89*
90 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 6410 Grasland met Pijpestrootje (Molinia) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion)

Geen verdere aanmelding

NL9801024: Gelderse Poort *gebied 27*
4967 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 3270 | Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot de Rivierganzenvoet-associatie en/of het Moerasandijvieverbond (Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p) |
| | 6120 | *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem |
| | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| | 91F0 | Gemengde bossen langs grote rivieren met Zomereik (Quercus robur)), Steeliiep (Ulmus laevis) en Es (Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia) (Ulmenion minoris) |
| Soort | 1337 | Bever |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 6430 | Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones |
| | 6510 | Laaggelegen schraal hooiland met Grote vossenstaart en/of Grote pimpernel (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| | 3150 | Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond (Magnopotamion of Hydrocharition) |
| Soort | 1014 | Nauwe korfslak |
| | 1095 | Rivierprik |
| | 1099 | Zeeprik |
| | 1102 | Elft |
| | 1106 | Zalm |
| | 1134 | Bittervoorn |
| | 1145 | Grote modderkruiper |
| | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1163 | Rivierdonderpad |
| | 1166 | Kamsalamander |
| | 1318 | Meervleermuis |

NL9801072: Korenburgerveen *gebied 39*
509 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 7120 | Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is |
| | 7210 | *Kalkhoudende moerassen met Galigaan (<i>Cladium mariscus</i>) en soorten van het Knopbies-verbond (<i>Caricion davallianae</i>) |
| | 91D0 | *Veenbossen: Berkenbos met veenmos |
| Soort | 1166 | Kamsalamander |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 3130 | Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (<i>Littorelletalia inuflorae</i>) en/of Dwergbiezenklasse (<i>Isoëto-Nanojuncetea</i>) |
| | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (<i>Erica teralix</i>) |
| | 6410 | Grasland met Pijpestrootje (<i>Molinia</i>) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (<i>Blauwgrasland</i> , EU-Molinion) |

NL3004005:

Leusveld, Voorstonden en Empesche-/Tondensche Heide *gebied 141*
698 ha

Belangrijkste gebied voor:

Soort 1166 Kamsalamander

Verder aangemeld voor:

Habitatype 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (*Littorelletalia uniflorae*) en/of Dwergbiezen-klasse (*Isoëto-Nanojuncetea*)
4010 Noord-Atlantisch vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)
6230 *Soortenrijk heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)
6410 Grasland met Pijpestrootje (*Molinia*) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion)
7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Snavelbies-verbond (*Rhynchosporion*)

Soort 1831 Drijvende waterweegbree

NL2003041: Rijswaard en Kil van Hurwenen *gebied 119*
458 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 6510 Laaggelegen schraal hooiland met Grote vossenstaart en/of Grote pimpernel (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

Verder aangemeld voor:

Habitatype 6120 *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (*Alnus glutinosa*) en Es (*Fraxinus excelsior*) (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

Soort 1166 Kamsalamander

NL2003044: Stelkampsveld (Beekvliet) *gebied 122*
90 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 7230 Alkalisch laagveen

Verder aangemeld voor:

Habitattype 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (*Littorelletalia uniflorae*) en/of Dwergbiezen-klasse (*Isoëto-Nanojuncetea*)
4010 Noord-Atlantisch vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)
4030 Droge Europese heide
6230 *Soortenrijk heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)

NL2003046: Teeselinkven *gebied 124*
20 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (*Littorelletalia uniflorae*) en/of Dwergbiezen-klasse (*Isoëto-Nanojuncetea*)

Verder aangemeld voor:

Habitatype 4010 Noord-Atlantisch vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)
4030 Droge Europese heide

Soort 1042 Gevlekte witsnuitlibel

NL9801023: Veluwe gebied 65
91454 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 2310 | Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Stekelbrem (Genista) |
| | 2330 | Open grasland met Buntgras en Struisgrassoorten (Corynephorus en Agrostis-soorten) op landduinen |
| | 3130 | Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (Littorelletalia uniflorae) en/of Dwergbiezen-klasse (Isoëto-Nanojuncetea) |
| | 3160 | Dystrofe natuurlijke poelen en meren |
| | 4030 | Droge Europese heide |
| | 6230 | *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) |
| | 7150 | Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Snelbies-verbond (Rhynchosporion) |
| | 9120 | Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Hulst (Ilex) of soms Taxus (Quercion robori-petraea of Ilici fagion) |
| | 9190 | Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Zomereik (Quercus robur) |
| Soort | 1083 | Vliegend hert |
| | 1096 | Beekprik |
| | 1163 | Rivierdonderpad |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 2320 | Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Kraaihei (Empetrum nigrum) |
| | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix) |
| | 5130 | Jeneverbes (Juniperus communis)-formaties in heide of kalkgrasland |
| | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| Soort | 1042 | Gevlekte witsnuitlibel |
| | 1318 | Meervleermuis |
| | 1166 | Kamsalamander |
| | 1831 | Drijvende waterweegbree |

NL2003051: Willinks Weust *gebied 129*
39 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitattype 5130 Jeneverbes (*Juniperus communis*)-formaties in heide of kalkgrasland
6230 *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)

Verder aangemeld voor:

- Habitattype 4010 Noordatlantische vochtige heide met dophei (*Erica tetralix*)
6410 Grasland met Pijpestrootje (*Molinia*) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion)
9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het Haagbeukenverbond (*Carpinion betuli*)
9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Zomereik (*Quercus robur*)
- Soort 1166 Kamsalamander

NL2003053: Wooldse Veen *gebied 131*
57 ha

Belangrijkste gebied omwille van grensoverschrijdendheid voor:

Habitattype 91D0 *Veenbossen: Berkenbos met veenmos

Verder aangemeld voor:

Habitattype 7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is

Soort 1166 Kamsalamander

NL3004007: Zuider Lingedijk en Diefdijk zuid *gebied 137*
483 ha

Belangrijkste gebied voor:

Soort 1166 Kamsalamander

Verder aangemeld voor:

Habitatype 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van montane en alpiene zones
91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (*Alnus glutinosa*) en Es (*Fraxinus excelsior*) (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

Soort 1134 Bittervoorn
1145 Grote modderkruiper
1149 Kleine modderkruiper

| |
|---------------------|
| Provincie Groningen |
|---------------------|

NL9801009: Drentsche Aa⁶ gebied 12

NL2003028: Lieftingsbroek gebied 106

NL2003062: Noordzeekustzone⁷ gebied 51

NL1000001: Waddenzee⁸ gebied 69

*Voor de kaarten per gebied wordt verwezen naar het
'Kaartenoverzicht'*

⁶ Zie Drenthe

⁷ Zie Friesland

⁸ Idem

NL2003028: Lieftingsbroek *gebied 106*
20 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 9120 Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Hulst (Ilex) en soms Taxus (Quercion robori-petraea of Ilici fagion)

Verder aangemeld voor:

Habitattype 9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het Haagbeukenverbond (Carpinion betuli)

| |
|-------------------|
| Provincie Limburg |
|-------------------|

NL2003002:

Abdij Lilbosch en voormalig Klooster Mariahoop gebied 80

NL9801076: Bemelerberg en Schiepersberg gebied 4

NL2003010: Boschhuizerbergen gebied 88

NL1000029: Brunsummerheide gebied 8

NL2003012: Bunder- en Elsloërbos gebied 90

NL2003016: Geleenbeekdal gebied 94

NL9801041: Geuldal gebied 28

NL9801075: Grensmaas gebied 29

NL1000025: Grootte Peel gebied 32

NL2003025: Kunderberg gebied 103

NL9803039: Leudal gebied 41

NL1000028: Maasduinen gebied 43

NL1000027: Mariapeel en Deurnesepeel gebied 45

NL2000008: Meinweg gebied 47

NL2003033: Noorbeemden en Hoogbos gebied 111

NL2003065: Ringselven en Kruispeel gebied 56

NL2003042: Roerdal gebied 120

NL2003043: Sarsven en De Banen gebied 121

NL9801040: Savelsbos gebied 59

NL3004004: St. Jansberg gebied 138

NL9801025: St. Pietersberg en Jekerdal gebied 62

NL2003045: Swalmdal gebied 123

NL9801035: Weerterbos gebied 71

NL2003055: Zeldersche Driessen gebied 133

Voor de kaarten per gebied wordt verwezen naar het 'Kaartenoverzicht'

NL2003002:

Abdij Lilbosch en voormalig Klooster Mariahoop *gebied 80*
14 ha

Belangrijkste gebied voor:

Soort 1321 Ingekorven vleermuis

Geen verdere aanmelding

NL9801076: Bemelerberg en Schiepersberg *gebied 4*
171 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 6110 | *Kalkminnend of basifiel grasland op rotsbodem behorend tot het Verbond van Wit vetkruid (<i>Alyso-Sedion albi</i>) |
| | 6210 | Droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende bodems (<i>Festuco-Bromentalia</i>) |
| | 6230 | *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) |
| Soort | 1193 | Geelbuikvuurpad |
| | 1318 | Meervleermuis |
| | 1321 | Ingekorven vleermuis |
| | 1324 | Vale vleermuis |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 9160 | Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het Haagbeukenverbond (<i>Carpinion betuli</i>) |
|------------|------|--|

NL2003010: Boschhuizerbergen *gebied 88*
298 ha

Belangrijkste gebied omwille van geografische spreiding voor:

Habitatype 5130 Jeneverbes (*Juniperus communis*)-formaties in heide of kalkgrasland

Verder aangemeld voor:

Habitatype 2310 Psammofiele heide met Struikhei (*Calluna*) en Stekelbrem (*Genista*)
2330 Open grasland met Buntgras en Struisgrassoorten (*Corynephorus*- en *Agrostis*-soorten) op landduinen
3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (*Littorelletalia uniflorae*) en/of Dwergbiezen-klasse (*Isoëto-Nanojuncetea*)

NL1000029: Brunsummerheide *gebied 8*
538 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 4030 Droge Europese heide

Verder aangemeld voor:

Habitatype 2330 Open grasland met Buntgras en Struisgrassoorten
(Corynephorus en Agrostis-soorten) op landduinen
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix)
91D0 *Veenbossen: Berkenbos met veenmos

NL2003012: Bunder- en Elsloërbos *gebied 90*
189 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitattype 7220 *Kalktufbronnen met tufsteenformatie en vegetatie van het Diknerfmos-verbond (Cratoneurion)
- 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het Haagbeukenverbond (Carpinion betuli)
- 91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (*Alnus glutinosa*) en Es (*Fraxinus excelsior*) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Verder aangemeld voor:

- Habitattype 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones
- Soort 1078 *Spaanse vlag

NL2003016: Geleenbeekdal *gebied 94*

226 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 7230 | Alkalisch laagveen |
| | 9120 | Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Hulst (Ilex) - of soms Taxus (Quercion robori-petraea of Ilici fagion) |
| | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| Soort | 1014 | Nauwe korfslak |
| | 1016 | Zeggekorfslak |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 3260 | Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot de Verbinden van Vlottende waterranonkel en/of Sterrekroos-Waterranonkel (Ranunculion fluitantis en Callitricho-Batrachion) |
| | 9160 | Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen behorend tot het Haagbeukenverbond (Carpinion betuli) |
| Soort | 1037 | Gaffellibel |
| | 1083 | Vliegend hert |
| | 1166 | Kamsalamander |

NL9801041: Geuldal *gebied 28*
2472 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 3260 | Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot de Verbonden van Vlottende waterranonkel en/of Sterrekroos-Waterranonkel (Ranunculion fluitantis en Callitricho-Batrachion) |
| | 6130 | Grasland op zinkhoudende bodem behorend tot het Zinkviooltjes-orde (Violetalia calaminariae) |
| | 6210 | Droge halfnatuurlijke graslanden en stuikvormende facies op kalkhoudende bodems (Festuco-Brometalia): *orchideeën |
| | 6230 | *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) |
| | 7220 | *Kalktufbronnen met tufsteenformaties en vegetatie van het Diknerfmos-verbond (Cratoneurion) |
| | 9110 | Beukenbossen van het type met Veldbies (Luzulo-Fagetum) |
| | 9160 | Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen behorend tot het Haagbeuken-verbond (Carpinion betuli) |
| | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| Soort | 1078 | *Spaanse vlag |
| | 1083 | Vliegend hert |
| | 1096 | Beekprik |
| | 1163 | Rivierdonderpad |
| | 1193 | Geelbuikvuurpad |
| | 1318 | Meervleermuis |
| | 1321 | Ingekorven vleermuis |
| | 1324 | Vale vleermuis |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 7230 | Alkalisch laagveen |
| | 9120 | Zuurminnende Atlantische beukenbossen met ondergroei van Hulst (Ilex) - of soms Taxus (Quercion robori-petraea of Ilici fagion) |
| Soort | 1166 | Kamsalamander |

NL9801075: Grensmaas *gebied 29*
301 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitatype 3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot de Verbonden van Vlottende waterranonkel en/of Sterrekroos-Waterranonkel (Ranunculion fluitantis en Callitricho-Batrachion)
- 3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot de Rivierganzenvoet-associatie en/of het Moerasandijvieverbond (Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p.)

Verder aangemeld voor:

- Habitatype 91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (*Alnus glutinosa*) en Es (*Fraxinus excelsior*) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
- Soort 1095 Zeeprik
1099 Rivierprik
1106 Zalm
1134 Bittervoorn
1149 Kleine modderkruiper
1163 Rivierdonderpad

NL1000025: Groote Peel *gebied 32*
1333 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is

Verder aangemeld voor:

Habitatype 4030 Droge Europese heide
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)

NL2003025: Kunderberg *gebied 103*
95 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 6210 Droge halfnatuurlijke graslanden en stuikvormende facies op kalkhoudende bodems (Festuco-Brometalia): *orchideeën

Verder aangemeld voor:

Habitatype 6230 *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)
9160 *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)

NL9803039: Leudal *gebied 41*
315 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (*Alnus glutinosa*) en Es (*Fraxinus excelsior*) (Alno-Padion, Alnion *incanae*, Salicion *albae*)

Verder aangemeld voor:

Habitattype 3260 Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot de Verbonden van Vlottende waterranonkel en/of Sterrekroos-Waterranonkel (*Ranunculion fluitantis* en *Callitricho-Batrachion*)

9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen behorend tot het Haagbeukenverbond (*Carpinion betuli*)

Soort 1166 Kamsalamander
1337 Bever

NL1000028: Maasduinen *gebied 43*
5328 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 2310 | Psammofiele heide met Struikhei (<i>Calluna</i>) en Stekelbrem (<i>Genista</i>) |
| | 2330 | Open grasland met Buntgras en Struisgrassoorten (<i>Corynephorus</i> en <i>Agrostis</i> -soorten) op landduinen |
| | 3160 | Dystrofe natuurlijke poelen en meren |
| | 6120 | *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem |
| | 7150 | Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Snavelbies-verbond (<i>Rhynchosporion</i>) |
| | 91D0 | *Veenbossen: Berkenbos met veenmos |
| Soort | 1831 | Drijvende waterweegbree |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 3130 | Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (<i>Littorelletalia uniflorae</i>) en/of de Dwergbiezen-klasse (<i>Isoëto-Nanojuncetea</i>) |
| | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (<i>Erica tetralix</i>) |
| | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (<i>Alnus glutinosa</i>) en Es (<i>Fraxinus excelsior</i>) (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) |
| Soort | 1337 | Bever |
| | 1149 | Kleine modderkruiper |

NL1000027: Mariapeel en Deurnesepeel *gebied 45*
2606 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is

Verdere aangemeld voor:

Habitatype 4030 Droge Europese heide
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)

NL2000008: Meinweg gebied 47
1804 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 4030 Droge Europese heide

Soort 1096 Beekprik

Verder aangemeld voor:

Habitatype 3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)
7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het
Snavelbies-verbond (*Rhynchosporion*)
9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met
Zomereik (*Quercus robur*)
91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (*Alnus glutinosa*) en Es
(*Fraxinus excelsior*) (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion*
albae)

Soort 1166 Kamsalamander
1831 Drijvende waterweegbree

NL2003033: Noorbeemden en Hoogbos *gebied 111*
43 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (*Alnus glutinosa*) en Es (*Fraxinus excelsior*) (Alno-Padion, Alnion *incanae*, Salicion *albae*)

Verder aangemeld voor:

Habitattype 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen behorend tot het Haagbeukenverbond (*Carpinion betuli*)

Soort 1083 Vliegend hert

NL2003065: Ringselven en Kruispeel *gebied 56*
293 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 7210 *Kalkhoudende moerassen met Galigaan (*Cladium mariscus*)
en soorten van het Knopbies-verbond (*Caricion davallianae*)

Verder aangemeld voor:

Habitattype 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie
behorend tot de Oeverkruid-orde (*Littorelletalia uniflorae*)
en/of de Dwergbiezen-klasse (*Isoëto-Nanojuncetea*)

Soort 1134 Bittervoorn
1149 Kleine modderkruiper
1166 Kamsalamander
1831 Drijvende waterweegbree

NL2003042: Roerdal *gebied 120*
767 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (<i>Alnus glutinosa</i>) en Es (<i>Fraxinus excelsior</i>) (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) |
| Soort | 1016 | Zeggekorfslak |
| | 1037 | Gaffelibel |
| | 1061 | Donker pimperlblauwtje |
| | 1099 | Rivierprik |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 3260 | Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot de Verbonden van Vlottende waterranonkel en/of Sterrekroos-Waterranonkel (<i>Ranunculion fluitantis</i> en <i>Callitricho-Batrachion</i>) |
| | 6120 | *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem |
| | 91D0 | *Veenbossen: Berkenbos met veenmos |
| Soort | 1078 | *Spaanse vlag |
| | 1134 | Bittervoorn |
| | 1163 | Rivierdonderpad |
| | 1166 | Kamsalamander |

NL2003043: Sarsven en de Banen *gebied 121*
141 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitattype 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Oeverkruid-orde (*Littorelletalia uniflorae*) en/of de Dwergbiezen-klasse (*Isoëto-Nanojuncetea*): Naaldwaterbies-verbond (*Eleocharition acicularis*)
- 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische vegetaties met Kranswieren (*Chara* spp.)

Verder aangemeld voor:

- Soort 1831 Drijvende waterweegbree

NL9801040: Savelsbos *gebied 59*
211 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitatype 6210 Droge, halfnatuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende bodems (Festuco-Brometalia): *orchideeën
- 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen behorend tot het Haagbeukenverbond (Carpinion betuli)
- Soort 1078 *Spaanse vlag
- 1321 Ingekorven vleermuis
- 1324 Vale vleermuis

Verder aangemeld voor:

- Habitatype 6120 *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
- Soort 1083 Vliegend hert

NL3004004: St. Jansberg *gebied 138*
225 ha

Belangrijkste gebied voor:

Soort 1083 Vliegend hert
1016 Zeggekorfslak

Verder aangemeld voor:

Habitatype 9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Zomereik (*Quercus robur*)
91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (*Alnus glutinosa*) en Es (*Fraxinus excelsior*) (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

NL9801025: St. Pietersberg en Jekerdal *gebied 62*
221 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 6110 | *Kalkminnend of basifiel grasland op rotsbodem behorend tot het Verbond van Wit vetkruid (<i>Alyso-Sedion albi</i>) |
| | 6210 | Droge halfnatuurlijke graslanden en struikvormende facies op kalkhoudende bodems (<i>Festuco-Brometalia</i>): *orchideeën |
| | 6230 | *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) |
| Soort | 1078 | *Spaanse vlag |
| | 1318 | Meervleermuis |
| | 1321 | Ingekorven vleermuis |
| | 1324 | Vale vleermuis |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 3260 | Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot de Verbonden van Vlottende waterranonkel en/of Sterrekroos-Waterranonkel (<i>Ranunculion fluitantis</i> en <i>Callitricho-Batrachion</i>) |
| | 9160 | Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen behorend tot het Haagbeukenverbond (<i>Carpinion betuli</i>) |
| | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (<i>Alnus glutinosa</i>) en Es (<i>Fraxinus excelsior</i>) (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) |

NL2003045: Swalmdal *gebied 123*
130 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 3260 | Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot de Verbonden van Vlottende waterranonkel en/of Sterrekroos-Waterranonkel (Ranunculion fluitantis en Callitricho-Batrachion) |
| | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (<i>Alnus glutinosa</i>) en Es (<i>Fraxinus excelsior</i>) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| Soort | 1016 | Zeggekorfslak |
| | 1163 | Rivierdonderpad |

Geen verdere aanmelding

NL9801035: Weerterbos *gebied 71*
1228 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Oeverkruid-orde (*Littorelletalia uniflorae*) en/of de Dwergbiezen-klasse (*Isoëto-Nanojuncetea*)

Verder aangemeld voor:

Habitattype 91D0 *Veenbossen: Berkenbos met veenmos

NL2003055: Zeldersche Driessen *gebied 133*
53 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 6120 *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem

Verder aangemeld voor:

Habitattype 91F0 Gemengde bossen langs grote rivieren met Zomereik (*Quercus robur*), Steeliep (*Ulmus laevis*), en Es (*Fraxinus excelsior* of *Fraxinus angustifolia*) (*Ulmion minoris*)

| |
|-------------------------|
| Provincie Noord-Brabant |
|-------------------------|

- NL3000040:** Biesbosch gebied 5
NL3004001:
Boezem van Brakel, Pompveld en Kornsche Boezem⁹ gebied 135
NL9801036: Groote Heide – De Plateaux gebied 31
NL1000025: Groote Peel¹⁰ gebied 32
NL3000401: Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen gebied 35
NL1000022: Kempenland gebied 36
NL1000021: Krammer-Volkerak gebied 40
NL2003026: Langstraat bij Sprang-Capelle gebied 104
NL9803030:
Loonse en Drunense Duinen, de Brand en de Leemkuilen gebied 42
NL1000027: Mariapeel en Deurnesepeel¹¹ gebied 45
NL2003035: Oeffeltermeent gebied 113
NL9801055: Ossendrecht gebied 54
NL9803073: Regte Heide en Rielse Laag gebied 55
NL2003065: Ringselven en Kruispeel¹² gebied 56
NL1000024: Strabrechtse Heide en Beuven gebied 63
NL2003047: Ulvenhoutse Bos gebied 125
NL9801049: Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek gebied 66
NL9801035: Weerterbos¹³ gebied 71

Voor de kaarten per gebied wordt verwezen naar het 'Kaartenoverzicht'

⁹ Zie Gelderland

¹⁰ Zie Limburg

¹¹ Idem

¹² Idem

¹³ Idem

NL3000040: Biesbosch *gebied 5*
9678 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 3260 | Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot de Verbonden van Vlottende waterranonkel en/of Sterrekroos-Waterranonkel (Ranunculion fluitantis en Callitricho-Batrachion) |
| | 3270 | Rivieren met slikoevers behorend tot de Rivierganzenvoet-associatie en/of het Moerasandijvie-verbond (Chenopodietum rubri p.p. en Bedention p.p.) |
| | 6120 | *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem |
| | 6430 | Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van montane en alpiene zones |
| | 6510 | Laaggelegen schraal hooiland met Grote vossenstaart en/of Grote pimpernel (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| Soort | 1145 | Grote modderkruiper |
| | 1337 | Bever |
| | 1340 | *Noordse woelmuis |
| | 1387 | Tonghaarmuts |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------|------|----------------------|
| Soort | 1095 | Zeeprík |
| | 1099 | Rivierprík |
| | 1102 | Elft |
| | 1103 | Fint |
| | 1106 | Zalm |
| | 1134 | Bittervoorn |
| | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1163 | Rivierdonderpad |

NL9801036: Groote Heide – De Plateaux *gebied 31*
4213 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 2310 | Psammofiele heide met Struikhei (<i>Calluna</i>) en Stekelbrem (<i>Genista</i>) |
| | 7210 | *Kalkhoudende moerassen met Galigaan (<i>Cladium mariscus</i>) en soorten van het Knobbies-verbond (<i>Caricion davallianae</i>) |
| | 91D0 | *Veenbossen: Berkenbos met veenmos |
| Soort | 1096 | Beekprik |
| | 1831 | Drijvende waterweegbree |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 3130 | Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (<i>Littorelletalia uniflorae</i>) en/of de Dwergbiezen-klasse (<i>Isoëto-Nanojuncetea</i>) |
| | 3260 | Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot de Verbonden van Vlottende waterranonkel en/of Sterrekroos-Waterranonkel (<i>Ranunculion fluitantis</i> en <i>Callitricho-Batrachion</i>) |
| | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (<i>Erica tetralix</i>) |
| | 6510 | Laaggelegen schraal hooiland met Grote vossenstaart en/of Grote pimpernel (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>) |
| | 7150 | Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Snelbries-verbond (<i>Rhynchosporion</i>) |
| | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (<i>Alnus glutinosa</i>) en Es (<i>Fraxinus excelsior</i>) (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) |
| Soort | 1042 | Gevlekte witsnuitlibel |
| | 1134 | Bittervoorn |
| | 1166 | Kamsalamander |

NL3000401: Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen *gebied 35*
2084 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 3110 | Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met oeverkruidvegetatie (Littorelletalia uniflorae) |
| | 3130 | Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (Littorelletalia uniflorae) en/of Dwergbiezen-klasse (Isoëto-Nanojuncetea) |
| | 3160 | Dystrofe natuurlijke poelen en meren |
| | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix) |
| Soort | 1831 | Drijvende waterweegbree |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 2310 | Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Stekelbrem (Genista) |
| | 6410 | Grasland met Pijpestrootje (Molinia) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion) |
| | 7210 | *Kalkhoudende moerassen met Galigaan (Cladium mariscus) en soorten van het Knopbies-verbond (Caricion davallianae) |
| | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| Soort | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1166 | Kamsalamander |

NL1000022: Kempenland *gebied 36*
1511 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 2310 | Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Stekelbrem (Genista) |
| | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix) |
| Soort | 1831 | Drijvende Waterweegbree |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 3130 | Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (Littorelletalia uniflorae) en/of de Dwergbiezen-klasse (Isoëto-Nanojuncetea) |
| | 7150 | Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Snelbies-verbond (Rhynchosporion) |
| | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| Soort | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1163 | Rivierdonderpad |

NL1000021: Krammer-Volkerak *gebied 40*
6080 ha

Belangrijkste gebied voor:

Soort 1340 *Noordse woelmuis

Verder aangemeld voor:

Habitatype 1310 Eenjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (*Salicornia* sp.) en andere zoutminnende soorten
1330 Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (*Glaucopuccinellietalia maritimae*)
6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van eht laagland en van de montane en alpiene zones

Soort 1134 Bittervoorn
1149 Kleine moderkruiper

NL2003026: Langstraat bij Sprang-Capelle *gebied 104*
488 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitattype 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische vegetaties met Kranswieren (Chara spp.)
7140 Overgangs- en trilvenen

Verder aangemeld voor:

- Habitattype 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond (Magnopotamion of Hydrocharition)
- Soort 1145 Grote modderkruiper
1149 Kleine modderkruiper
1831 Drijvende waterweegbree

NL9803030:

Loonse en Drunense Duinen, de Brand en de Leemkuilen *gebied 42*
4082 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 2330 | Open grasland met Buntgras en Struisgrassoorten (Corynephorus en Agrstis-soorten) op landduinen |
| Soort | 1166 | Kamsalamander |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 2310 | Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Stekelbrem (Genista) |
| | 3130 | Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (Littorelletalia uniflorae) en/of de Dwergbiezen-klasse (Isoëto-Nanojuncetea) |
| | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix) |
| | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| Soort | 1831 | Drijvende waterweegbree |

NL2003035: Oeffeltermoent *gebied 113*
103 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 6120 *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem

Verder aangemeld voor:

Soort 1149 Kleine modderkruiper
1166 Kamsalamander

NL9801055: Ossendrecht *gebied 54*
1746 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 2310 | Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Stekelbrem (Genista) |
| Soort | 1831 | Drijvende waterweegbree |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 3130 | Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (Littorelletalia uniflorae) en/of de Dwergbiezen-klasse (Isoëto-Nanojuncetea) |
| | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix) |

NL9803073: Regte Heide en Rielse Laag *gebied 55*
521 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)

Verder aangemeld voor:

Habitatype 2310 Psammofiele heide met Struikhei (*Calluna*) en Stekelbrem (*Genista*)

3160 Dystrofe natuurlijke meren en poelen

Soort 1166 Kamsalamander

NL1000024: Strabrechtse Heide en Beuven *gebied 63*
1790 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitatype 2310 Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Stekelbrem (Genista)
3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Noord-Atlantische zandvlakten met oeverkruidvegetatie (Littorelletalia uniflorae)
3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (Littorelletalia uniflorae) en/of Dwergbiezen-klasse (Isoëto-Nanojuncetea)

Verder aangemeld voor:

- Habitatype 2330 Open grasland met Buntgras en Struisgrassoorten (Corynephorus en Agrostis-soorten) op landduinen
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix)
91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
- Soort 1831 Drijvende waterweegbree

NL2003047: Ulvenhoutse Bos *gebied 125*
112 ha

Belangrijkste gebied omwille van geografische spreiding voor:

Habitattype 91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (*Alnus glutinosa*) en Es (*Fraxinus excelsior*) (Alno-Padion, Alnion *incanae*, Salicion *albae*)

Verder aangemeld voor:

Habitattype 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen behorend tot het Haagbeukenverbond (*Carpinion betuli*)

NL9801049: Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek *gebied 66*
1174 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 3140 | Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische vegetaties met Kranswieren (Chara spp.) |
| Soort | 1059 | Pimpernelblauwtje |
| | 1061 | Donker pimpernelblauwtje |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 6410 | Grasland met Pijpestrootje (Molinia) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion) |
| | 6510 | Laaggelegen schraal hooiland met Grote vossenstaart en/of Grote pimperle (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| Soort | 1145 | Grote modderkruiper |
| | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1831 | Drijvende waterweegbree |

| |
|-------------------------|
| Provincie Noord-Holland |
|-------------------------|

NL1000010: Duinen Schoorl gebied 17

NL2003060:

Duinen Texel, Waal en Burg, Dijkmanshuizen en de Bol gebied 19

NL3000016: Duinen Zwanenwater en Pettemerduinen gebied 21

NL1000009: Duinen Den Helder - Callantsoog gebied 22

NL3004002: Eilandspolder-oost gebied 136

NL2003017: Gouzee en Kustzone Muiden gebied 95

NL2003023: Ilperveld/Oostzanerveld/Varkensland gebied 101

NL1000012: Kennemerland-zuid gebied 37

NL3000061: Naardermeer gebied 48

NL9801080: Noordhollands Duinreservaat gebied 50

NL2003062: Noordzeekustzone¹⁴ gebied 51

NL2003036: Oostelijke Vechtпlassen gebied 114

NL2003040: Polder Westzaan gebied 118

NL1000001: Waddenzee¹⁵ gebied 69

NL2003054: Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder gebied 132

*Voor de kaarten per gebied wordt verwezen naar het
'Kaartenoverzicht'*

¹⁴ Zie Friesland

¹⁵ Idem

NL1000010: Duinen Schoorl *gebied 17*
1743 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 2140 | *Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei (<i>Empetrum nigrum</i>) |
| | 2180 | Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 2120 | Wandelende duinen op de strandwal met Helm (<i>Ammophila arenaria</i> ; z.g. witte duinen) |
| | 2130 | *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) |
| | 2190 | Vochtige duinvalleien |
| Soort | 1014 | Nauwe korfslak |

NL2003060:

Duinen Texel, Waal en Burg, Dijkmanshuizen en de Bol *gebied 19*
4657 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 1310 | Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (<i>Salicornia</i> sp.) en andere zoutminnende soorten |
| | 1330 | Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (<i>Glaucopuccinellietalia maritimae</i>) |
| | 2130 | *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) |
| | 2140 | *Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei (<i>Empetrum nigrum</i>) |
| | 2160 | Duinen met Duindoorn (<i>Hippophaë rhamnoides</i>) |
| | 2170 | Duinen met Kruipwilg (<i>Salix repens</i> ssp. <i>argentea</i>) |
| | 2190 | Vochtige duinvalleien |
| | 7210 | *Kalkhoudende moerassen met Galigaan (<i>Cladium mariscus</i>) en soorten van het Knopbies-verbond (<i>Caricion davallianae</i>) |
| Soort | 1340 | *Noordse woelmuis |
| | 1903 | Groenknolorchis |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 2110 | Embryonale wandelende duinen |
| | 2120 | Wandelende duinen op de strandwal met Helm (<i>Ammophila arenaria</i> ; z.g. witte duinen) |

NL3000016: Duinen Zwanenwater en Pettemerduinen *gebied 21*
772 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitatype 2140 *Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei (*Empetrum nigrum*)
2170 Duinen met Kruiwilg (*Salix repens* ssp. *argentea*)
2190 Vochtige duinvalleien
6230 *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)

Verder aangemeld voor:

- Habitatype 2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen)

NL1000009: Duinen Den Helder–Callantsoog *gebied 22*
698 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen)

Verder aangemeld voor:

Habitattype 2140 *Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei (*Empetrum nigrum*)
2160 Duinen met Duindoorn (*Hippophaë rhamnoides*)
2170 Duinen met Kruipwilg (*Salix repens* ssp. *argentea*)
2190 Vochtige duinvalleien

NL3004002: Eilandspolder-oost *gebied 136*
801 ha

Belangrijkste gebied voor:

Soort 1340 *Noordse woelmuis

Verder aangemeld voor:

Habitatype 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en
van de montane en alpiene zones

7140 Overgangs- en trilvenen

Soort 1134 Bittervoorn

1149 Kleine modderkruiper

NL2003017: Gouwzee en Kustzone Muiden *gebied 95*
1110 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische vegetaties met Kranswieren (*Chara* spp.)

Verder aangemeld voor:

Soort 1134 Bittervoorn
1163 Rivierdonderpad
1318 Meervleermuis

NL2003023: IJperveld/Oostzanerveld/Varkensland *gebied 101*
1905 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (<i>Erica tetralix</i>) |
| | 7140 | Overgangs- en trilvenen |
| Soort | 1340 | *Noordse woelmuis |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 3140 | Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren bentische vegetaties met kranswieren (<i>Chara</i> spp.) |
| | 6430 | Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones |
| | 91D0 | *Veenbossen: Berkenbos met veenmos |
| Soort | 1134 | Bittervoorn |
| | 1145 | Grote modderkruiper |
| | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1163 | Rivierdonderpad |
| | 1318 | Meervleermuis |

NL1000012: Kennemerland-zuid *gebied 37*
8243ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 2130 | *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) |
| | 2150 | *Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea) |
| | 2160 | Duinen met Duindoorn (<i>Hippophaë rhamnoides</i>) |
| | 2180 | Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied |
| | 2190 | Vochtige duinvalleien |
| Soort | 1014 | Nauwe korfslak |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 2110 | Embryonale wandelende duinen |
| | 2120 | Wandelende duinen op de strandwal met Helm (<i>Ammophila arenaria</i> ; z.g. witte duinen) |
| | 2170 | Duinen met Kruipwilg (<i>Salix repens</i> ssp. <i>argentea</i>) |
| Soort | 1903 | Groenknolorchis |

NL3000061: Naardermeer *gebied 48*
1152 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitattype 3140 Kalkhoudende oligotrofe-mesotrofe wateren met benthische vegetaties met Kranswieren (*Chara* spp.)
3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond (Magnopotamion of Hydrocharition)
91D0 *Veenbossen: Berkenbos met veenmos

Verder aangemeld voor:

- Habitattype 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)
6410 Grasland met Pijpestrootje (*Molinia*) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion)
7140 Overgangs- en trilveen
- Soort 1134 Bittervoorn
1149 Kleine modderkruiper
1318 Meervleermuis
1903 Groenknolorchis

NL9801080: Noordhollands Duinreservaat *gebied 50*
5204 ha

Belangrijkste gebied voor:

- | | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 2130 | *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) |
| | 2140 | *Vastgelegde ontkalkte duinen met Kraaihei (Empetrum nigrum) |
| | 2180 | Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied |

Verder aangemeld voor:

- | | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | . | |
| | 2120 | Wandelende duinen op de strandwal met Helm (Ammophila arenaria; z.g. witte duinen) |
| | 2160 | Duinen met Duindoorn (Hippophaë rhamnoides) |
| | 2170 | Duinen met Kruipwilg (Salix repens ssp. argentea) |
| | 2190 | Vochtige duinvalleien |
| Soort | 1014 | Nauwe korfslak |
| | 1042 | Gevlekte witsnuitlibel |

NL2003036: Oostelijke Vechtplassen *gebied 114*
3270 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 3150 | Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond (Magnopotamion of Hydrocharition) |
| | 7140 | Overgangs- en trilveen |
| | 91D0 | *Veenbossen: Berkenbos met veenmos |
| Soort | 1042 | Gevlekte witsnuitlibel |
| | 1082 | Gestreepte waterroofkever |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 3140 | Kalkhoudende oligotrofe wateren met bentische vegetaties met Kranswieren (Chara spp.) |
| | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix) |
| | 6410 | Grasland met Pijpestrootje (Molinia) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion) |
| | 7210 | *Kalkhoudende moerassen met Galigaan (Cladium mariscus) en soorten van het Knopbies-verbond (Caricion davallianae) |
| Soort | 1134 | Bittervoorn |
| | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1166 | Kamsalamander |
| | 1163 | Rivierdonderpad |
| | 1318 | Meervleermuis |
| | 1340 | *Noordse woelmuis |
| | 1903 | Groenknolorchis |

NL2003040: Polder Westzaan *gebied 118*
1065 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 6430 | Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones |
| Soort | 1340 | *Noordse woelmuis |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (<i>Erica tetralix</i>) |
| | 7140 | Overgangs- en trilveen |
| Soort | 1134 | Bittervoorn |
| | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1318 | Meervleermuis |

NL2003054: Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder *gebied 132*
1435 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (<i>Erica tetralix</i>) |
| | 6430 | Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones |
| | 7140 | Overgangs- en trilveen |
| Soort | 1340 | *Noordse woelmuis |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------|------|----------------------|
| Soort | 1134 | Bittervoorn |
| | 1145 | Grote modderkruiper |
| | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1163 | Rivierdonderpad |
| | 1318 | Meervleermuis |

| |
|----------------------|
| Provincie Overijssel |
|----------------------|

- NL2003001:** Aamsveen gebied 79
- NL2003003:**
Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek gebied 81
- NL2003007:** Bergvennen en Brecklenkampse Veld gebied 85
- NL2003008:** Boddenbroek gebied 86
- NL2003009:** Boetelerveld gebied 87
- NL9801016:** Borkeld gebied 6
- NL9801019:** Buurserzand en Haaksbergerveen gebied 9
- NL9801021:** Dinkelland gebied 11
- NL1000004:** Engbertsdijksvenen gebied 24
- NL2003022:** IJsseluiterwaarden gebied 100
- NL3004003:** Landgoederen Oldenzaal gebied 139
- NL2003027:** Lemselermaten gebied 105
- NL2003029:** Lonnekermeer gebied 107
- NL2003063:** Olde Maten en Veerslootlanden gebied 52
- NL9803015:** Sallandse Heuvelrug gebied 58
- NL9801064:** Springendal en Dal van de Mosbeek gebied 61
- NL9801017:** Vecht en Beneden-Regge gebied 64
- NL9801013:** Weerribben gebied 70
- NL2003064:** Wieden gebied 74
- NL9801018:** Wierdense Veld gebied 75
- NL2003052:** Witte Veen gebied 130
- NL1000005:** Zwarte Water gebied 77
- NL2003056:** Zwarte Meer¹⁶ gebied 134

Voor de kaarten per gebied wordt verwezen naar het 'Kaartenoverzicht'

¹⁶ Zie Flevoland

NL2003001: Aamsveen *gebied 79*
146 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 91D0 *Veenbossen: Berkenbos met veenmos

Verder aangemeld voor:

Habitattype 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)
4030 Droge Europese heide
7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is
6230 *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)
91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (*Alnus glutinosa*) en Es (*Fraxinus excelsior*) (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

Soort 1166 Kamsalamander

NL2003003:

Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek *gebied 81*

306 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen behorend tot het Haagbeukenverbond (*Carpinion betuli*)

Verder aangemeld voor:

Habitattype 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (*Littorelletalia uniflorae*) en/of de Dwergbiezen-klasse (*Isoëto-Nanojuncetea*)
91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (*Alnus glutinosa*) en Es (*Fraxinus excelsior*) (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

Soort 1166 Kamsalamander

NL2003007: Bergvennen en Brecklenkampse Veld *gebied 85*
110 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met oeverkruidvegetatie (Littorelletalia uniflorae)

Verder aangemeld voor:

Habitatype 2310 Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Stekelbrem (Genista)
3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (Littorelletalia uniflorae) en/of de Dwergbiezen-klasse (Isoëto-Nanojuncetea)
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix)
4030 Droge Europese heide
5130 Jeneverbes (Juniperus communis)-formaties in heide of kalkgrasland
6230 *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)

Soort 1166 Kamsalamander

NL2003008: Boddibroek *gebied 86*
5 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitattype 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (*Littorelletalia uniflorae*) en/of de Dwergbiezen-klasse (*Isoëto-Nanojuncetea*)
7230 Alkalisch laagveen

Verder aangemeld voor:

- Habitattype 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)

NL2003009: Boetelerveld *gebied 87*
173 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)

Verder aangemeld voor:

Habitatype 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (*Littorelletalia uniflorae*) en/of Dwergbiezen-klasse (*Isoëto-Nanojuncetea*)
4030 Droge Europese heide
5130 Jeneverbes (*Juniperus communis*)-formaties in heide of kalkgrasland
6230 *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)
6410 Grasland met Pijpestrootje (*Molinia*) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion)

Soort 1831 Drijvende waterweegbree

NL9801016: Borkeld *gebied 6*
513 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitatype 5130 Jeneverbes (*Juniperus communis*)-formaties in heide of kalkgrasland:
6230 *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)

Verder aangemeld voor:

- Habitatype 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)
4030 Droge Europese heide

NL9801019: Buurserzand en Haaksbergerveen *gebied 9*
1257 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 2310 | Psammofiele heide met Struikhei (Calluna) en Stekelbrem (Genista) |
| | 7120 | Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is |
| | 91D0 | *Veenbossen: Berkenbos met veenmos |
| Soort | 1145 | Grote modderkruiper |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 3130 | Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (Littorelletalia uniflorae) en/of Dwergbiezen-klasse (Isoëto-Nanojuncetea) |
| | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (Erica tetralix) |
| | 5130 | Jeneverbes (Juniperus communis)-formaties in heide of kalkgrasland |
| Soort | 1166 | Kamsalamander |

NL9801021: Dinkelland *gebied 11*
990ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 3130 | Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (<i>Littorelletalia uniflorae</i>) en/of de Dwergbiezen-klasse (<i>Isoëto-Nanojuncetea</i>) |
| | 6410 | Grasland met Pijpestrootje (<i>Molinia</i>) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion) |
| Soort | 1163 | Rivierdonderpad |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (<i>Erica tetralix</i>) |
| | 4030 | Droge Europese heide |
| | 5130 | Jeneverbes (<i>Juniperus communis</i>)-formaties in heide of kalkgrasland |
| | 6120 | *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem |
| | 6230 | *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) |
| | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (<i>Alnus glutinosa</i>) en Es (<i>Fraxinus excelsior</i>) (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) |
| Soort | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1831 | Drijvende waterweegbree |

NL1000004: Engbertsdijksvenen *gebied 24*
1001 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is

Verder aangemeld voor:

Habitatype 2320 Psammofiele heide met Struikhei (*Calluna*) en Kraaihei (*Empetrum nigrum*)
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)

NL2003022: IJsseluiterwaarden *gebied 100*
1538 ha

Belangrijkste gebied voor:

- | | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 3260 | Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot de Verbonden van Vlottende waterranonkel en/of Sterrekroos-Waterranonkel (Ranunculion fluitantis en Callitricho-Batrachion): Waterlelie-verbond (Nymphaeion) |
| | 6120 | *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem |
| | 6510 | Laaggelegen schraal hooiland met Grote vossenstaart en/of Grote pimpernel (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) |
| | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| | 91F0 | Gemengde bossen langs grote rivieren met Zomereik (Quercus robur), Steeliep (Ulmus laevis), en Es (Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris) |

Verder aangemeld voor:

- | | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 3270 | Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot de Rivierganzenvoet-associatie en/of het Moerasandijvie-verbond (Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p) |
| | 6430 | Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones |
| Soort | 1134 | Bittervoorn |
| | 1145 | Grote modderkruiper |
| | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1163 | Rivierdonderpad |
| | 1166 | Kamsalamander |

NL3004003: Landgoederen Oldenzaal *gebied 139*
521 ha

Belangrijkste gebied voor:

Soort 1166 Kamsalamander

Verder aangemeld voor:

Habitatype 9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen behorend tot het Haagbeukenverbond (*Carpinion betuli*)
91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (*Alnus glutinosa*) en Es (*Fraxinus excelsior*) (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

NL2003027: Lemselermaten *gebied 105*
55 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (*Littorelletalia uniflorae*) en/of de Dwergbiezen-klasse (*Isoëto-Nanojuncetea*)
7230 Alkalisch laagveen

Geen verdere aanmelding

NL2003029: Lonnekermeer *gebied 107*
103 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 3130 | Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (<i>Littorelletalia uniflorae</i>) en/of de Dwergbiezen-klasse (<i>Isoëto-Nanojuncetea</i>) |
| Soort | 1042 | Gevlekte witsnuitlibel |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide |
| | 4030 | Droge Europese heide |
| | 6230 | *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) |
| | 6410 | Grasland met Pijpestrootje (<i>Molinia</i>) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion) |
| | 6430 | Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones |

NL2003063: Olde Maten en Veerslootslanden *gebied 52*
993 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitattype 6410 Grasland met Pijpestrootje (Molinia) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion)
- Soort 1145 Grote modderkruiper

Verder aangemeld voor:

- Habitattype 3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond (Magnopotamion of Hydrocharition)
- 7140 Overgangs- en trilveen
- Soort 1134 Bittervoorn
- 1149 Kleine modderkruiper

NL9803015: Sallandse Heuvelrug *gebied 58*
2227 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 4030 Droge Europese heide

Verder aangemeld voor:

Habitatype 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dopheide (Erica tetralix)

5130 Jeneverbes (Juniperus communis)-formaties in heide of kalkgrasland

Soort 1166 Kamsalamander

NL9801064: Springendal en Dal van de Mosbeek *gebied 61*
1273 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 7230 | Alkalisch laagveen |
| | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (<i>Alnus glutinosa</i>) en Es (<i>Fraxinus excelsior</i>) (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) |
| Soort | 1083 | Vliegend hert |
| | 1096 | Beekprik |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (<i>Erica tetralix</i>) |
| | 4030 | Droge Europese heide |
| | 5130 | Jeneverbes (<i>Juniperus communis</i>)-formaties in heide of kalkgrasland |
| | 6230 | *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) |
| Soort | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1166 | Kamsalamander |
| | 1831 | Drijvende waterwegbree |

NL9801017: Vecht en Beneden-Regge *gebied 64*
4068 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 4030 | Droge Europese heide |
| | 5130 | Jeneverbes (<i>Juniperus communis</i>)-formaties in heide of kalkgrasland |
| | 7150 | Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Snavelbies-verbond (<i>Rynchosporion</i>) |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 2310 | Psammofiele heide met Struikhei (<i>Calluna</i>) en Stekelbrem (<i>Genista</i>) |
| | 2330 | Open grasland met Buntgras en Struisgrassoorten (<i>Corynephorus</i> en <i>Agrostis</i> -soorten) op landduinen |
| | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (<i>Erica tetralix</i>) |
| | 6120 | *Kalkminnend graslanden op dorre zandbodem |
| | 6230 | *Soortenrijke heischrale graslanden, op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) |
| | 6430 | Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van montane en alpiene zones |
| | 9190 | Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Zomereik (<i>Quercus robur</i>) |
| | 91E0 | *Alluviale bossen met Zwarte els (<i>Alnus glutinosa</i>) en Es (<i>Fraxinus excelsior</i>) (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) |
| Soort | 1134 | Bittervoorn |
| | 1145 | Grote modderkruiper |
| | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1163 | Rivierdonderpad |
| | 1166 | Kamsalamander |
| | 1318 | Meervleermuis |

NL9801013: Weerribben *gebied 70*
3383 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 7140 | Overgangs- en trilveen |
| | 7210 | *Kalkhoudende moerassen met Galigaan (<i>Cladium mariscus</i>) en soorten van het Knopbies-verbond (<i>Caricion davallianae</i>) |
| | 91D0 | *Veenbossen: Berkenbos met veenmos |
| Soort | 1042 | Gevlekte witsnuitlibel |
| | 1060 | Grote vuurvliinder |
| | 1082 | Gestreepte waterroofkever |
| | 1903 | Groenknolorchis |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 3140 | Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische vegetaties met Kranswieren (<i>Chara</i> spp.) |
| | 3150 | Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond (<i>Magnopotamion</i> of <i>Hydrocharition</i>) |
| | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (<i>Erica tetralix</i>) |
| | 6410 | Grasland met Pijpestrootje (<i>Molinia</i>) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion) |
| | 6430 | Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones |
| Soort | 1134 | Bittervoorn |
| | 1145 | Grote modderkruiper |
| | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1163 | Rivierdonderpad |
| | 1318 | Meervleermuis |

NL2003064: Wieden *gebied 74*
7534 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 3150 | Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond (Magnopotamion of Hydrocharition) |
| | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (<i>Erica tetralix</i>): Hoogveenmos-verbond (Oxycocco-Ericion) |
| | 7140 | Overgangs- en trilveen |
| | 7210 | *Kalkhoudende moerassen met Galigaan (<i>Cladium mariscus</i>) en soorten van het Knopbies-verbond (<i>Caricion davallianae</i>) |
| Soort | 1042 | Gevlekte witsnuitlibel |
| | 1060 | Grote vuurvliinder |
| | 1393 | Geel schorpioenmos |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 3140 | Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische vegetaties met Kranswieren (<i>Chara</i> spp.) |
| | 6410 | Grasland met Pijpestrootje (<i>Molinia</i>) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion) |
| | 6430 | Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones |
| | 91D0 | *Veenbossen: Berkenbos met veenmos |
| Soort | 1134 | Bittervoorn |
| | 1145 | Grote modderkruiper |
| | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1163 | Rivierdonderpad |
| | 1318 | Meervleermuis |
| | 1903 | Groenknolorchis |

NL9801018: Wierdense Veld *gebied 75*
420 ha

Belangrijkste gebied omwille van dekkingspercentage voor:

Habitatype 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)

Verder aangemeld voor:

Habitatype 4030 Droge Europese heide
7120 Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog
mogelijk is
91D0 *Veenbossen: Berkenbos met veenmos

NL2003052: Witte Veen *gebied 130*
294 ha

Belangrijkste gebied omwille van grensoverschrijdendheid voor:

Habitatype 4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Dophei (*Erica tetralix*)

Verder aangemeld voor:

Habitatypen 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Oeverkruid-orde (*Littorelletalia uniflorae*) en/of de Dwergbiezen-klasse (*Isoëto-Nanojuncetea*)

4030 Droge Europese heide

91D0 *Veenbossen: Berkenbos met veenmos

Soort 1166 Kamsalamander

NL1000005: Zwarte Water *gebied 77*
1107 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitattype 6510 Laaggelegen schraal hooiland met Grote vossenstaart en/of Grote pimpernel (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 91F0 Gemengde bossen langs grote rivieren met Zomereik (*Quercus robur*), Steeliep (*Ulmus laevis*), en Es (*Fraxinus excelsior* of *Fraxinus angustifolia*) (*Ulmenion minoris*)

Verder aangemeld voor:

- Habitattype 3150 Van nature eutrofe meren met vegetaties van het Verbond van grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond (*Magnopotamion* of *Hydrocharition*)
- 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones
- Soort 1134 Bittervoorn
- 1149 Kleine modderkruiper

| |
|-------------------|
| Provincie Utrecht |
|-------------------|

NL2003004: Amerongse Bovenpolder gebied 82

NL9801044: Botshol gebied 7

NL2003018: Groot Zandbrink gebied 96

NL2003024: Kolland en Overlangbroek gebied 102

NL2003030: Luistenbuul en Koekoeksche Waard¹⁷ gebied 108

NL2003036: Oostelijke Vechtplassen¹⁸ gebied 114

*Voor de kaarten per gebied wordt verwezen naar het
'Kaartenoverzicht'*

¹⁷ Zie Zuid-Holland

¹⁸ Zie Noord-Holland

NL2003004: Amerongse Bovenpolder *gebied 82*
53 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 6510 Laaggelegen schraal hooiland met Grote vossenstaart en/of Grote pimpernel (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

Geen verdere aanmelding

NL9801044: Botshol *gebied 7*
215 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 7210 *Kalkhoudende moerassen met Galigaan (*Cladium mariscus*) en soorten van het Knopbies-verbond (*Caricion davallianae*)

Verder aangemeld voor:

Habitattype 3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische vegetaties met Kranswieren (*Chara* spp.)
3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond (*Magnopotamion* of *Hydrocharition*)
6410 Grasland met Pijpestrootje (*Molinia*) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion)
6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones
7140 Overgangs- en trilveen
91D0 *Veenbossen: Berkenbos met veenmos

Soort 1134 Bittervoorn
1149 Kleine modderkruiper
1163 Rivierdonderpad
1318 Meervleermuis

NL2003018: Groot Zandbrink *gebied 96*
10 ha

Belangrijkste gebied omwille van geografische spreiding voor:

Habitattype 7230 Alkalisch laagveen

Verder aangemeld voor:

Habitattype 4030 Droge Europese heide
6230 *Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van
berggebieden (en van submontane gebieden in het
binnenland van Europa)

NL2003024: Kolland en Overlangbroek *gebied102*
179 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (*Alnus glutinosa*) en Es (*Fraxinus excelsior*) (Alno-Padion, Alnion *incanae*, Salicion *albae*)

Geen verdere aanmelding

| |
|-------------------|
| Provincie Zeeland |
|-------------------|

- NL2003013:** Canisvlietse Kreek gebied 91
- NL4000021:** Grevelingen gebied 30
- NL2003019:** Grootte Gat gebied 97
- NL1000017:** Kop van Schouwen gebied 38
- NL1000021:** Krammer-Volkerak¹⁹ gebied 40
- NL1000020:** Manteling van Walcheren gebied 44
- NL1000018:** Oosterschelde gebied 53
- NL2003049:** Vogelkreek gebied 127
- NL4000017:** Voordelta gebied 67
- NL9803061:** Westerschelde gebied 73
- NL3000027:** Zwin gebied 78

Voor de kaarten per gebied wordt verwezen naar het 'Kaartenoverzicht'

¹⁹ Zie Noord-Brabant

NL2003013: Canisvlietse Kreek *gebied 91*
143 ha

Belangrijkste gebied voor:

Soort 1614 Kruipend moerasscherf

Geen verdere aanmelding

NL4000021: Grevelingen *gebied 30*
13856 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 1310 | Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (<i>Salicornia</i> sp.) en andere zoutminnende soorten |
| Soort | 1340 | *Noordse woelmuis |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 1330 | Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (<i>Glaucopuccinellietalia maritimae</i>) |
| | 2170 | Duinen met Kruipwilg (<i>Salix repens</i> ssp. <i>argentea</i>) |
| | 2190 | Vochtige duinvalleien |
| Soort | 1903 | Groenknolorchis |

NL2003019: Groote Gat *gebied 97*
78 ha

Belangrijkste gebied voor:

Soort 1614 Kruipend moerasscherf

Verder aangemeld voor:

Habitatype 1330 Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (Glaucopuccinellietalia maritimae)
6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones

NL1000017: Kop van Schouwen *gebied 38*
2291 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|-------------|------|--|
| Habitattype | 2130 | *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) |
| | 2150 | *Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea) |
| | 2160 | Duinen met Duindoorn (<i>Hippophaë rhamnoides</i>) |
| | 2190 | Vochtige duinvalleien |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|-------------|------|---|
| Habitattype | 2120 | Wandelende duinen op de strandwal met Helm (<i>Ammophila arenaria</i> ; z.g. witte duinen) |
| | 2170 | Duinen met Kruipwilg (<i>Salix repens</i> ssp. <i>argentea</i>) |
| | 2180 | Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied |
| Soort | 1340 | *Noordse woelmuis |
| | 1903 | Groenknolorchis |

NL1000020: Manteling van Walcheren *gebied 44*
790 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied

Verder aangemeld voor:

Habitattype 2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen)
2150 *Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)
2160 Duinen met Duindoorn (*Hippophaë rhamnoides*)
2190 Vochtige duinvalleien

Soort 1014 Nauwe korfslak

NL1000018: Oosterschelde*gebied 53*
36725 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitattype 1160 Grote, ondiepe krekens en baaien
1330 Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (Glaucopuccinellietalia maritimae)

Verder aangemeld voor:

- Habitattype 1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (*Salicornia* sp.) en andere zoutminnende soorten
1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (*Spartinion maritimae*)
- Soort 1340 *Noordse woelmuis
1365 Zeehond

NL2003049: Vogelkreek *gebied 127*
100 ha

Belangrijkste gebied voor:

Soort 1614 Kruiwend moerasschernd

Geen verdere aanmelding

NL4000017: Voordelta *gebied 67*
88942 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 1110 | Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken |
| | 1140 | Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten |
| Soort | 1103 | Fint |
| | 1365 | Zeehond |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 1310 | Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (<i>Salicornia</i> sp.) en andere zoutminnende soorten |
| | 1320 | Schorren met slijkgrasvegetatie (<i>Spartinion maritimae</i>) |
| | 1330 | Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (<i>Glaucopuccinellietalia maritimae</i>) |
| Soort | 1095 | Zeeprik |
| | 1099 | Rivierprik |
| | 1102 | Elft |
| | 1106 | Zalm |

NL9803061: Westerschelde *gebied 73*
42840 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitattype 1130 Estuaria
1330 Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (*Glaucopuccinellietalia maritimae*)

Verder aangemeld voor:

- Habitattype 2110 Embryonale wandelende duinen
2120 Wandelende duinen op de strandwal met Helm (*Ammophila arenaria*; z.g. witte duinen)
2160 Duinen met duindoorn
2190 Vochtige duinvalleien
1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (*Salicornia* sp.) en andere zoutminnende soorten
1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (*Spartinion maritimae*)
- Soort 1014 Nauwe korfslak
1095 Zeeprik
1099 Rivierprik
1103 Fint
1365 Zeehond
1903 Groenknolorchis

NL3000027: Zwin *gebied 78*
95 ha

Belangrijkste gebied voor:

- Habitattype 1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (*Salicornia* sp.) en andere zoutminnende soorten
2110 Embryonale wandelende duinen

Verder aangemeld voor:

- Habitattype 1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (*Spartinion maritimae*)
1330 Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (*Glaucopuccinellietalia maritimae*)
2120 Wandelende duinen op de strandwal met Helm (*Ammophila arenaria*; z.g. witte duinen)
2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen)
2160 Duinen met Duindoorn (*Hippophaë rhamnoides*)
- Soort 1166 Kamsalamander

| |
|------------------------|
| Provincie Zuid-Holland |
|------------------------|

- NL3000040:** Biesbosch²⁰ gebied 5
- NL1000030:** Coepelduynen gebied 10
- NL9801079:** Duinen Goeree gebied 15
- NL4000021:** Grevelingen²¹ gebied 30
- NL1000015:** Haringvliet gebied 33
- NL2003021:** Hollands Diep (oeverlanden) gebied 99
- NL1000012:** Kennemerland-zuid²² gebied 37
- NL1000021:** Krammer-Volkerak²³ gebied 40
- NL2003030:** Luistenbuul en Koekoeksche Waard gebied 108
- NL1000013:** Meijndel en Berkheide gebied 46
- NL3000036:** Nieuwkoopse Plassen en De Haeck gebied 49
- NL2003037:** Oude Maas gebied 116
- NL2003039:** Polder Stein gebied 117
- NL1000016:** Solleveld gebied 60
- NL4000017:** Voordelta²⁴ gebied 67
- NL9803077:** Voornes Duin gebied 68
- NL1000014:** Westduinpark en Wapendal gebied 72
- NL3004006:** Zouweboezem gebied 140

Voor de kaarten per gebied wordt verwezen naar het 'Kaartenoverzicht'

²⁰ Zie Noord-Brabant

²¹ Zie Zeeland

²² Zie Noord-Holland

²³ Zie Noord-Brabant

²⁴ Zie Zeeland

NL1000030: Coepelduynen *gebied 10*
198 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen)

Verder aangemeld voor:

Habitattype 2120 Wandelende duinen op de strandwal met Helm (*Ammophila arenaria*; z.g. witte duinen)

2160 Duinen met Duindoorn (*Hippophaë rhamnoides*)

2170 Duinen met Kruipwilg (*Salix repens* ssp. *argentea*)

2190 Vochtige duinvalleien

Soort 1014 Nauwe korfslak

NL9801079: Duinen Goeree *gebied 15*

1366 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 1310 | Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (<i>Salicornia</i> sp.) en andere zoutminnende soorten |
| | 1330 | Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (<i>Glaucopuccinellietalia maritimae</i>) |
| | 2110 | Embryonale wandelende duinen |
| | 2120 | Wandelende duinen op de strandwal met Helm (<i>Ammophila arenaria</i> ; z.g. witte duinen) |
| | 2130 | *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) |
| Soort | 1014 | Nauwe korfslak |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 1320 | Schorren met slijkgrasvegetatie (<i>Spartinion maritimae</i>) |
| | 2160 | Duinen met Duindoorn (<i>Hippophaë rhamnoides</i>) |
| | 2190 | Vochtige duinvaleien |
| | 6430 | Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones |
| Soort | 1340 | *Noordse woelmuis |

NL1000015: Haringvliet *gebied 33*

11108 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones

Soort 1103 Fint
1340 *Noordse woelmuis

Verder aangemeld voor:

Habitatype 3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot de Rivierganzenoet-associatie en/of het Moerasandijvieverbond (*Chenopodietum rubri* p.p. en *Bidention* p.p)

Soort 1095 Zeeprik
1099 Rivierprik
1102 Elft
1106 Zalm
1134 Bittervoorn
1163 Rivierdonderpad

NL2003021: Hollands Diep (oeverlanden) *gebied 99*
357 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (*Alnus glutinosa*) en Es (*Fraxinus excelsior*) (Alno-Padion, Alnion *incanae*, Salicion *albae*)

Verder aangemeld voor:

Soort 1340 *Noordse woelmuis

NL2003030: Luistenbuul en Koekoeksche Waard *gebied 108*
103 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 6120 *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem

Verder aangemeld voor:

Habitatype 6510 Laaggelegen schraal hooiland met Grote vossenstaart en/of Grote pimpernel (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Soort 1166 Kamsalamander

NL1000013: Meijendel en Berkheide *gebied 46*
2856 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 2130 | *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) |
| | 2160 | Duinen met Duindoorn (<i>Hippophaë rhamnoides</i>) |
| | 2180 | Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied |
| Soort | 1014 | Nauwe korfslak |
| | 1318 | Meervleermuis |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 2120 | Wandelende duinen op de strandwal met Helm (<i>Ammophila arenaria</i> ; z.g. witte duinen) |
| | 2190 | Vochtige duinvalleien |

NL3000036: Nieuwkoopse Plassen en de Haeck *gebied 49*
2060 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 3150 | Van nature eutrofe meren met vegetatie van het Verbond van grote fonteinkruiden of het Kikkerbeet-verbond (Magnopotamion of Hydrocharition) |
| | 4010 | Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix |
| | 7210 | *Kalkhoudende moerassen met Galigaan (Cladium mariscus) en soorten van het Knopbies-verbond (Caricion davallianae) |
| Soort | 1340 | *Noordse woelmuis |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 3140 | Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met bentische vegetaties met Kranswieren (Chara spp.) |
| | 6410 | Grasland met Pijpestrootje (Molinia) op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Blauwgrasland, EU-Molinion) |
| | 7140 | Overgangs- en trilveen |
| | 91D0 | *Veenbossen: Berkenbos met veenmos |
| Soort | 1082 | Gestreepte waterroofkever |
| | 1134 | Bittervoorn |
| | 1149 | Kleine modderkruiper |
| | 1318 | Meervleermuis |
| | 1903 | Groenknolorchis |

NL2003037: Oude Maas *gebied 116*
349 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones
91E0 *Alluviale bossen met Zwarte els (*Alnus glutinosa*) en Es (*Fraxinus excelsior*) (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

Verder aangemeld voor:

Soort 1340 *Noordse woelmuis

NL2003039: Polder Stein *gebied 117*
203 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 6510 Laaggelegen schraal hooiland met Grote vossenstaart en/of Grote pimpernel (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)

Verder aangemeld voor:

Habitatype 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones

Soort 1134 Bittervoorn
1149 Kleine modderkruiper

NL1000016: Solleveld *gebied 60*
348 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitattype 2150 *Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)

Verder aangemeld voor:

Habitattype 2120 Wandelende duinen op de strandwal met Helm (Ammophila arenaria; z.g. witte duinen)

2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen)

2160 Duinen met Duindoorn (Hippophaë rhamnoides)

2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied

Soort 1014 Nauwe korfslak

NL9803077: Voornes Duin *gebied 68*
1421 ha

Belangrijkste gebied voor:

| | | |
|------------|------|--|
| Habitatype | 2130 | *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) |
| | 2180 | Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied |
| | 2190 | Vochtige duinvalleien |
| Soort | 1014 | Nauwe korfslak |
| | 1903 | Groenknolorchis |

Verder aangemeld voor:

| | | |
|------------|------|---|
| Habitatype | 2120 | Wandelende duinen op de strandwal met Helm (<i>Ammophila arenaria</i> ; z.g. witte duinen) |
| | 2150 | *Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (<i>Calluno-Ulicetea</i>) |
| | 2160 | Duinen met Duindoorn (<i>Hippophaë rhamnoides</i>) |
| | 2170 | Duinen met Kruipwilg (<i>Salix repens</i> ssp. <i>argentea</i>) |
| Soort | 1340 | *Noordse woelmuis |

NL1000014: Westduinpark en Wapendal *gebied 72*
246 ha

Belangrijkste gebied voor:

Habitatype 2150 *Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)

Verder aangemeld voor:

Habitatype 2130 *Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen)
2160 Duinen met Duindoorn (*Hippophaë rhamnoides*)
2180 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied

NL3004006: Zouweboezem *gebied 140*
258 ha

Belangrijkste gebied voor:

Soort 1145 Grote modderkruiper

Verder aangemeld voor:

Soort 1134 Bittervoorn
1149 Kleine modderkruiper